



**Aliette®**

**12 kg**

**Fungicide  
met bio-systemische werking**

Toelatingsnummer:  
11561 N

W2

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

**Art.nr. 79919727**

**Productnaam:** Aliette WG

**Werkzame stof:** Fosetyl-aluminium

**Gehalte:** 80%

**Toelatingsnummer:** 11561 N - W2

**Aard van het preparaat:** water dispergeerbaar granulaat

**Formuleringstype:** WG

**Waarschuwingssinnen:** Irriterend voor de ogen. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

**Veiligheidsaanbevelingen:** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met vloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart.

Kan bij (langdurig) contact corrosie veroorzaken bij metalen.

**Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.**

**Droog, koel en achter slot bewaren.**

**Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.**

Chargenummer: zie elders op de verpakking



Irriterend

**STORL** Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld zoals wettelijk is voorgeschreven.  
**VERPAKKING**

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de -na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Bayer CropScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer CropScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren. Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

Stand: 29/06/2007

Bayer CropScience B.V.  
Postbus 231  
3640 AE Mijdrecht  
Tel. 0297-280618



**Bayer CropScience**



4 000680 074526

## EERSTE HULP MAATREGELEN

**Algemene aanbevelingen:** Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk het etiket tonen).

**Inademing:** Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Het slachtoffer warm en rustig houden. In de frisse lucht brengen.

**Contact met de huid:** Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken. Met zeep en water wassen.

**Contact met de ogen:** Onmiddellijk met veel water afwassen gedurende tenminste 15 minuten. Behandeling door een oogarts.

**Inslikken:** Geen braken opwekken. Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten drinken. Onmiddellijk een arts of Vergiftigingen Informatie Centrum verwittigen. Het slachtoffer warm en rustig houden.

## WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

**Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel:**

NL79649487I

- a. in de onbedekte teelt van aardbeien;
- c. in de teelt van witlof op water.

### Veiligheidstermijnen:

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan: 14 dagen voor aardbei

Handmatig dompelen van aardbeienplanten is niet toegestaan.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

## GEBRUIKSAANWIJZING TOEPASSINGEN

**AARDBEIEN**, ter bestrijding van stengelbasisrot (*Phytophthora cactorum*) en roodwortelrot (*Phytophthora fragariae*).

## WIJZE VAN TOEPASSING:

**I. tegen stengelbasisrot** (*Phytophthora cactorum*).

### A. DOMPELEN.

De planten kort voor het uitplanten gedurende 15 minuten dompelen. Het dompelbad kan slechts één dag worden gebruikt, waarbij voorkomen dient te worden, dat het dompelbad te veel vervuult. Na iedere dompeling de verloren gegane vloeistof aanvullen met een oplossing van de normale sterkte (0,25%). Voor elke dompeling het bad goed oproeren. De resterende dompelvloeistof mag uitsluitend worden verwerkt via een aangietbehandeling na het planten (max. 100 ml per plant).

**Dosering:** 0,25% (250 gram middel per 100 liter water).

## B. RIJENBESPUITING.

Direkt na het uitplanten en vastregenen een rijenbehandeling uitvoeren. Op vermeerderingsvelden kan op het moment van uitleggen van de uitlopers een volveldsbespuiting worden uitgevoerd in dezelfde dosering.

**Dosering:** 75 gram middel per are in 10 liter water.

**II. tegen roodwortelrot** (*Phytophthora fragariae*).

In de eerste week van oktober en ca. 4 weken later een rijenbehandeling uitvoeren. Het verdient aanbeveling om op zwaar besmette percelen een herbehandeling uit te voeren in het voorjaar (maart).

Op vermeerderingsvelden kan na het uitleggen van de uitlopers een volveldsbespuiting worden uitgevoerd in dezelfde dosering.

**Dosering:** 75 gram middel per are in 10 liter water.

**WITLOF**, ter bestrijding van verslijming veroorzaakt door *Phytophthora spp.* in de teelt op water. Het middel direkt na het opzetten van de pennen toevoegen aan het proceswater. Het water daarna in circulatie brengen.

**Dosering:** 0,03% (30 gram per 100 liter water).

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd (en de kas gedurende 2 uur geventileerd is); werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

**Vermijd huidcontact met behandelde planten.**

